

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: XXX

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

UZMAN PERSONEL:

| Zararlı Türü- Yaşam evresi | Uygulama alanı ve şekli | Uygulama dozu | Seyreltme oranı | Uygulama miktarı |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Karasinek | Boş kapalı alan | 37,5 mg a.i/ m ² | 125 ml ürün 4.875 ml su ile karıştırılır | 5.000 ml / 100 m ² |
| Hamamböceği | Yüzey spreylemesi | 150 mg a.i/ m ² | 500 ml ürün 4.500 ml su ile karıştırılır | 5.000 ml / 100 m ² |
| Karasinek | Açık Alan - ULV | 10 gr a.i /Ha | Seyreltmeden kullanıma hazır | 335 ml / Ha |
| Sivrisinek | | 12,5 gr a.i /Ha | Seyreltmeden kullanıma hazır | 415 ml / Ha |
| Karasinek | ULV – boş kapalı alanlar | 0,8 mg a.i/ m ³ | Seyreltmeden kullanıma hazır | 80 ml/3000 m ³ |
| Hamamböceği | (depo, hangar vb.) | 1,5 mg a.i/ m ³ | | 150 ml/3000 m ³ |

Kullanma şekli:

PyButhrin EW su içerisinde emülsiyon (EW) formülasyonunda olan bir insektisit spreyidir. PyButhrin EW, spreyleme yapabilen el pompaları veya mekanik, elektrikli pompalar 40-45 cm mesafeden kapalı alanlarda yüzey uygulaması ve elektrikli veya motorlu ULV makineleri ile kapalı ve açık alanlarda uygulanır.

Uygulama yapılan alan, yüzeyler kuruduktan sonra (60 dakika kapalı tutulduktan sonra) ve en az 60 dakika havalandırıldıktan sonra kullanılabilir.

Uygulamadan Önce:

Açık alanlarda yapılacak uygulamalarda uygulamadan önce, insan ve hayvanların etkilenmemesi amacıyla uygulama yapılacak bölge sakinleri yapılacak uygulama hakkında bilgilendirilmeli, kişilerin uygulama bulutuna maruz kalmamaları yönünde gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda; Uygulama yapılacak alanda inceleme yapılarak hedef zararlının saklandığı, yuvalandığı, gezindiği ve dinlendiği alanlar tespit edilir. Ortam hazır hale getirildikten sonra, yukarıdaki tabloda belirtilen şekilde (hedef zararlı ve uygulama metoduna sulandırılmadan ve uygun oranda sulandırılarak) uygulama yapılır. Kapalı alan uygulamalarında, varsa iç alan havalandırmasını yapan cihazlar (klima, vantilatör vb.) ile kapı ve

pencereler kapatılmalıdır. Uygulama yapılacak alanda, uygulama anında insan ve hayvan bulunmamalıdır.

Uygulayıcı personel Kişisel Koruyucu Malzemeleri (eldiven, koruyucu elbise, maske ve iş gözlüğü) MUTLAKA kullanmalıdır

Uygulama Anında:

Açık alanlarda yapılacak uygulamalarda Karasinek ve Sivrisineklerin aktif olduğu saatler göz önünde bulundurularak karasinek mücadelesi için sabahın erken saatleri, sivrisinek ve tatarcık mücadelesi için akşam gün batımı saatlerinden sonra uygulama yapılması gerekir. Uygulama yoğun rüzgâr şartlarında veya yağmurlu dönemlerde yapılmaz.

Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda; Uygulama yüzey spreylemesi olarak yapılacak ise, uygulama cihazının spreyleme yapan ucu (nozül) yüzeye 40-45 cm mesafede olacak şekilde püskürtme yapılır. Uygulama ULV yöntemiyle yapılacaksa, ULV chazı hedeflenen tüm alanın hacimsel olarak ilaçlı sis bulutu ile kaplanmasını sağlayacak şekilde konumlandırılarak uygulama yapılmalıdır. Ambalajlı olsa dahi doğrudan gıda maddelerinin ve açıkta bulunan giyim eşyaları ile insan vücuduna temas eden malzemelerin üzerine uygulama yapılmamalıdır. Hamamböceği mücadelesi için, tezgâh altları, süpürgelikler ile dolap ve elektrikli ekipmanlarının arkası gibi saklandıkları alanlar tercih edilmelidir.

Keneler genellikle duvarlardaki yarık ve çatlaklar gibi korunaklı **Uygulamadan Sonra:** **Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda,** Kullanımdan sonra odayı en az 1 saat kapalı tutunuz. Ardından odayı en az 1 saat süreyle havalandırınız. Mutfakta uygulama anında açıkta kalan yüzey ve malzemeler bol sabunlu suyla yıkandıktan sonra kullanılmalıdır.

Üretici firmanın adı ve adresi;
Bayer Environmental Science
S.A.S. 16 Rue Jean Marie Leclair
CP 106
69266 Lyon CEDEX 09 Fransa

Ruhsat sahibinin adı ve adresi;
Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
Cad. No: 53
34770 Ümraniye / İstanbul

Net miktarı: 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 1 litre, 5 litre, 10 litre e

Ürünün normal koşullarda (25 ± 2 °C) raf ömrü 2 yıldır.
Ambalajı açılmış ürünü 3 ay içerisinde kullanınız.

KULLANICI GRUBU
(EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)
KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ

Celal KAMIŞLI
Ankara Kamu İlişkileri
Sorumlusu

BAYER TÜRK KİMYA SAN.LTD.ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No:53 Ümraniye / İstanbul
Tel: (0216) 528 36 00
Faks: (0216) 528 38 68



PyButhrin EW

Formülasyon şekli
EW (Su içerisinde Emülsiyon)

Aktif maddenin adı ve miktarı (%w/w)

- *Chrysanthemum cinerariaefolium*, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO₂: %3 (saf) CAS no: 89997-63-7
 - Piperonilbütoksit (PBO): %13,5 (saf) CAS no:51-03-6
- Yardımcı Maddeler ve Miktarları:**
Yüzey aktif maddesi ve koruyucu %7,55, Köpük Önleyici ve Çözücü %71,78 ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, ŞİĞARA KULLANMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Boş ambalajı usulüne uygun olarak imha ediniz.

Zehirlenme belirtileri:

Yüz ve mukoza membranlarda geçici ve çok hafif bir his olabilir. Ürün pyrethroid içerir. Piretroid zehirlenmesi, karbamat veya organofosfor zehirlenmesiyle karıştırılmamalıdır.



26 Temmuz 2022

ÜRÜN TİPİ 18 (İNSEKTİSİT)

İlk Yardım Önlemleri:

Genel öneri: Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırıp taşıyınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

Solunum: Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Deri teması: Hemen bol su ve sabun ile min.15 dak. yıkayınız. İritasyon durumunda doktora başvurunuz.

Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. Tahriş oluşur ve devam ederse doktora başvurunuz.

Ağız yoluyla alma: Ağız çalkalanmalı ve içmek için az miktarlarda su verilmelidir. Kusturmayın. Kazazedeyi tek başına bırakmayınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik antidotu yoktur. Kendiliğinden ve devamsız iyileşme mevcuttur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kapalı, kilit altındaki odalarda saklayınız. Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış (25±2 °C) yerlerde saklayınız. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. Donmaya karşı koruyunuz. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Arılar için zehirlidir.

TEHLİKE ACIKLAMALARI

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

H332 Solunması halinde zararlıdır

EUH208 sinerin içeren piretrinler, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one/2-methyl-4-isothiazolin-3-one içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir

EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

ÖNLEM ACIKLAMALARI

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın

P273 Çevreye verilmesinden kaçının

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

P391 Döküntüleri toplayın

P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız

Uyarı kelimesi: Dikkat



Celal KAMIŞLI
Ankara Kamu İlişkileri
Sorumlusuz

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
F.atih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No:58 Ümraniye / İstanbul
Te : (0216) 528 36 00
Faks : (0216) 528 38 68