

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şerh/ Seri/ Parti numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarih ve Numarası: 11.01.2011 – 2011 / 304

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon seçilme ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü- Uygulanma Yaşam evresi	Uygulanma şekli	İstasyon içerisinde	Uygulanma oranlığı
Fare – Ergin	Mesken ve mesken dışındaki popülasyonlarda 5 m' de bir, yoğun popülasyonlarda 3 m' de bir uygulanır.	İstasyon başına 20-30 grann	3-3 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulamaya tekerrür kararı verilir.
İstasyon ve mesken dışındaki popülasyonlarda 5 m' de bir, yoğun popülasyonlarda 5 m' de bir uygulanır.	İstasyon başına 100 grann	2-3 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulamaya tekerrür kararı verilir.	

1 pasta yem= 10 gram

**Kullanma şekli:**

1. Ambalajın açılmasından önce ayararak midede tıkanıklığın önlenmesi için, ambalajın iç kısmında bulunan ELDİVEN kullanınız. Bu hem sizi koruyacak hem de fare ve sıçanların insan kokusundan etkilenerek yem tüketiminden kaçınmasını engelleyecektir.
2. **Rodilon Paste** antikoagülant özelliğe sahip bir zehirli yemdir. Antikoagülant fare zehirlenim ekti makroorganizma sebzobiyle fare tarafından yendikten sonraki 4 ila 10 gün içerisinde ölüm gerçekleşir. Bu zehirlenim ekti süresinde, kolondaki diğer fareler ölümün hangi yemden kaynaklandığını tespit edemezler ve **Rodilon Paste** ile beslenmeye devam ederler.
3. Uygulama, fare zehrini dış etkilerden koruyacak şekilde korunmalı ve sağlamlıkta olan ve diğer sıcaklıkta canlılar tarafından kolaylıkla açılmayacak şekilde kapalı veya ulaştırılması zor alanlara (Yem İstasyonu içerisinde) yapılmalıdır.
4. Yem istasyonlarının yerleştirilceği en iyi alanlar, kemirne izi olan yerler ile kemirne dişlerinin görüldüğü alanlar, asına tavaneler ile insan aktivitesinin az olduğu karanlık ve kuyulu bölgelerdir.
5. Çatı faneleri, binaların üst katları ve tavandan asılan duvarlara yapışık veya binyaya birtişik ağaç ve bitkiler ile elektrik veya benzeri kabloların üzerinden geçen zararlı yapılmaktadır.
6. Sıçanlar, yuvalarını çoğunlukla kanalizasyon sistemlerine veya toprak alanlara yapmaktadır. Mesken çevresindeki, özellikle sı kaynaklarına yakın toprak alanlar yuvalama olup olmadığının dikkatle incelenmeli ve yuvalama varsa uygulanmalıdır.
7. Açıkta gıda maddesi bırakılmaması, fare ve sıçanların kolayca ulaşabileceği su kaynaklarının ortadan kaldırılması, yuvalama alanı oluşturulmuş alanların kontrol altına alınması fare ve sıçan midede tıkanıklığına hızla çözülmesi açısından son derece faydalı olacaktır. Fare ve sıçanlar ortamdaki değişikliklerden tedirgin olduklarından, **Rodilon Paste** uygulamasından hemen önce yapılacak değişiklikler midede tıkanıklığı olumsuz yönde etkileyebilir ve fare ve sıçanların yemi tüketmesini geciktirebilir.
8. 2-3 gün aralıklarla yem istasyonlarını kontrol ederek tüketilen yemlerin yerine yenilerini ekleyiniz.
9. Tüketilmeyen yemlerin bulunduğu istasyonlara yerlerini ve buluşuk ve bozulmuş yemleri yenisi ile değiştirin.
10. Fare ve sıçanların izleri kayboluncaya kadar uygulamaya devam ediniz.

Üretici firmamızın adı ve adresi:

Liphatech S.A.S., Production centre, Av Jean Serrès, ZA Malherbe,  
47480 Pont du Cassé, FRANSAA

Dolun yeri adı ve adresi:

Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti  
Barış Mah. Amiral Cad. No: 1 41410 Gebze / KOCAELİ

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bayer Türk Kimya San 1 Ltd Şti

Fatih Sultan Mehmet Mah. Bahçane cad. No: 53

34770 Ümraniye / İSTANBUL

İthalat miktarı: 750 kg

Net Ağırlık: 100 g (10 x 10g) - 150 g (15 x 10 g) - 200 g (20 x 10 g) - 250 g (25 x 10 g) - 300 g (30 x 10 g) - 350 g (35 x 10 g) - 400 g (40 x 10 g) - 500 g (50 x 10 g) - 750 g (75 x 10 g) - 1000 g (100 x 10 g) - 1200 g (120 x 10 g) - 1250 g (125 x 10 g) - 1500 g (150 x 10 g) - 2000 g (200 x 10 g) - 3000 g (300 x 10 g) - 5000 g (500 x 10 g) / 50 x 100 gramlık poşetler (her bir poşet 10 adet 10 gramlık pasta içerir) / 5 x 1000 gramlık poşetler (her bir poşet 100 adet 10 gramlık pasta içerir) - 7500 g (750 x 10 g) - 10000 g (1000 x 10 g) e

Ambalajın açılışını izlemi 1 ay içerisinde kullanınız.

Ürünün raf ömrü 25±2 °C'de 2 yıldır.

**KULLANICI GRUBU**

(EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ**



**Rodilon® Paste**

Fare ve Sıçanlara Karşı

Antikoagülant özellikli Rodentisit

Formülasyon şekli

Pasta

Akif maddenin adı ve miktarı (% a/a)

Difenitalone, (sald) % 0,0025 CAS No: 104653-34-1

Yardımcı maddeler ve miktarları

%69,9965 diğer yardımcı maddeler ve %60,001 Birtex ile % 100'e tamamlanır.

- Fare ve sıçanlara karşı etkili
- İçerisindeki Birtex insanlarla ve hedef dışı canlıların yemi kaza ile yemesini önler.

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE YEMLERDEN UZAK TUTUNUZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR SEV YEMEYİNİZ.ÇEVREYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.**

SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIMI TALİMATINA DUYUNUZ.

**BOSALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:**

Bosalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

İlker LÖDDÖS

Mesul Müdür

Kalite Kontrol Müdürü

**Efeçapıt**

**ÜRÜN TİPİ 14**

**RODENTİSİT**

Zehirlenme belirtileri:

RODİLON PASTE 'nin muhtelif ve kullanımasında dikkatsizlik ve ihmali sonucu eğizdan alındığı takdirde hemen doktora başvurunuz.

**İlk yardım önlemleri:**

**Genel öneri:** Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi sabitli yan konumunda yatırıp taşıyınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkartın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

**Deri teması:** Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

**Göz teması:** Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Tahriş oluşur ve devam ederse doktora gidiniz.

**Ağız yoluyla alma:** Ağzı galkalayınız. Kusurmuyunuz. Doktora başvurunuz. Doktor için uyarılar semptomları: Çiçnek ve kanama oluşumu, Kan ihritva eden idrar, Kanlı dışkı, Kan ihritva eden kusmuk, Burun kanaması, Dişeti kanaması

**Antidota ve gerekli bilgiler**

K1 Vitamini

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİ (UZEM)NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde 25±2 °C'de saklayınız. Original kabı içinde saklayınız. Yetkili personel tarafından girilip çıkılan odalarda saklayınız. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Arılar için zehirlidir.

**TEHLİKELİ ACIKLAMALARI**

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H412 Suda ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ECH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**ÖNLEM ACIKLAMALARI**

P101 Tıbbi tavsiye gerektiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P260 Tozunu/ dumunu/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solunmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın.

P501 İçerikler/kabı yere, yönetmeliklere uygun olarak atınız.



Uyarı Kelimesi:

Bakanlık Onayı:

07 Mayıs 2020

**Efeçapıt**